

**PROGRAMA DE MELHORIAS
DA QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA
E EDUCAÇÃO CONTINUADA
DE PRODUTORES**



Lençóis Paulista/SP
(14) 3269 3900
ramal 3942

São Félix do Xingu/PA
(94) 3435 1240
ramal 2907

Água Azul do Norte/PA
(94) 3435 1240
ramal 1636

www.frigol.com.br


PROGRAMA DE MELHORIAS DA QUALIDADE DA MATÉRIA PRIMA E EDUCAÇÃO CONTINUADA DE PRODUTORES

Vacinação

Vacinas são substâncias que ao serem introduzidas no organismo de um animal, induzem uma reação do sistema imunológico (sistema de defesa)

Recomendações

- Ao comprar a vacina verifique a data de validade se o acondicionamento das mesmas está correto e que vai se manter até a aplicação.
- Planejar a vacinação é muito importante. Faça uma revisão nas instalações, mantenha limpas e secas para evitar quedas e escorregões, procure pontos que possam vir a machucar os animais, realize a vacinação nas horas mais frescas do dia, faça teste se as porteiras e tronco se estão com boa abertura e fechamento, isso vai dar agilidade ao trabalho e evitar que animais estresse e lesões nos animais.
- Avalie a dosagem a ser utilizadas, o tamanho da agulha e o local da aplicação
- Deixe tudo preparado para a vacinação, leve a vacina em recipiente adequado para manter a temperatura se necessário, sempre estar com o material para colocar as agulhas para esterilização.
- O manejo dos animais deve ser realizada com calma e tranquilidade sempre evitando o estresse.
- Aplique a vacina na tábua do pescoço do animal ou conforme recomendado pelo fabricante, posicione a seringa na posição paralela ao pescoço do animal, puxe o couro, introduza a agulha e aplique a vacina. Para vacina intramuscular, mantenha a seringa na posição perpendicular ao pescoço do animal, introduza a agulha e injete a vacina.
- É importante utilizar uma agulha no frasco para puxar o líquido e outra para aplicação evitando a contaminação do produto dentro do frasco.
- Recomenda-se aplicar a vacina e a cada 10 animais ou a cada recarga da pistola fazer a troca da agulha, para auxiliar evitando a infecção secundária e formação de abscesso.
- A pistola e as agulhas devem ser limpas após o trabalho, coloque em água fervente por 15 minutos. Retire as agulhas esterilizadas da vasilha com água fervente, colocando-as sobre papel absorvente limpo e seco. Cubra com outra folha de papel. Guardar em local adequado.
- Ao final do trabalho, faça o possível para passar os animais novamente pela seringa, brete e tronco de contenção, assim os animais não vai guardar na memória que o local é apenas para sentir dor.



-Aplicação sem os devidos cuidados leva a reação vacinal e consequentemente a perdas tanto na fazenda como no frigorífico.

Dra Ana Paula Flaminio
Médica Veterinária- CRMV-SP 11880
PhD em monitoramento de Patógenos
e Desinfecção avançada/ Unesp

Dra Carla Bastos de Lima
Médica Veterinária - CRMV-RS 12580
Supervisora Corporativa de
Bem-Estar Animal/ Frigorol